

Atención Integral Adolescencia y Juventud

ADOLESCENCIA

Comprende desde los 12 años a los 17 años, se caracteriza por importantes y rápidas transformaciones a nivel de procesos psicosociales, neurocognitivos, físicos y sexuales que repercuten de forma importante en el devenir y futuro de las personas.

Esquema de atenciones

	CONSULTAS	12 AÑOS	13 AÑOS	14 AÑOS	15 AÑOS	16 AÑOS	17 AÑOS
VALORACIÓN INTEGRAL	Atención en salud por medicina general o medicina familiar	X		X		X	
	Atención en salud por profesional de enfermería		X		X		X
	Atención en salud bucal por profesional de odontología	Una vez al año					

JUVENTUD

Comprende desde los 18 años a los 28 años, es el momento de consolidación de la autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural, lo que se evidencia en actitudes de seguridad, poder y dominio. Este programa permite Detectar tempranamente los problemas de salud y situaciones vitales que afectan el desarrollo de la población entre los 18 y 28 años de edad, interviniendo factores de riesgo y potenciando factores protectores. Igualmente Promueve el autocuidado, los factores protectores y el control de los factores de riesgo.

Esquema de atenciones

	CONSULTAS	AÑOS										
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
VALORACIÓN INTEGRAL	Atención en salud por medicina general o medicina familiar	Una vez en este rango						Una vez en este rango				
	Atención en salud bucal por profesional de odontología	Una vez cada dos años										
DETECCIÓN TEMPRANA	Tamizaje de riesgo cardiovascular: glicemia basal, perfil lipídico, creatinina, uroanálisis	Según clasificación del riesgo										
	Prueba rápida treponémica	Según exposición al riesgo (relaciones sexuales sin protección)										
	Prueba rápida para VIH	Según exposición al riesgo (relaciones sexuales sin protección)										
	Asesoría pre y pos test VIH	Según exposición al riesgo (relaciones sexuales sin protección)										
	Prueba rápida para Hepatitis B	Según exposición al riesgo (relaciones sexuales sin protección)										
	Prueba rápida para Hepatitis C	Una vez en estas edades, cuando se identifique antecedentes de transfusiones de sangre antes de 1996										
	Prueba de embarazo	En caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha										